

## FRENTE

# ALGIODENT

Tirotricina - Benzocaína -Hexilresorcinol - Cresol

Colutorio

Industria Argentina

#### COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Tirotricina 0,1 g, Benzocaína 5,0 g, Hexilresorcinol 0,01 g, Cresol 1,0 g, Excipientes: Propilenglicol, Polisorbato 80, Etanol 96°, Esencia de Menta, Agua Purificada c.s.p. 100 ml.

**Código ATC:** A01A.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Antibiótico, antiséptico y anestésico de la cavidad orofaríngea.

#### INDICACIONES:

**ALGIODENT Colutorio** está indicado como coadyuvante para el tratamiento local de las afecciones limitadas a la mucosa bucal y la orofaringe. En el caso de manifestaciones generales de infección bacteriana, un antibiótico por vía general debe ser administrado.

#### ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

La TIROTRICINA es un antibiótico polipeptídico de acción local bactericida. Está compuesto por un 20% de Gramicidina y un 80% de Tirocidina. La Gramicidina es el componente más potente de ambos, y le otorga actividad bactericida frente a gérmenes Gram positivos. El HEXILRESORCINOL y el CRESOL son antisépticos fenólicos tópicos.

La BENZOCAÍNA es anestésico local que actúa previniendo la generación y transmisión de los impulsos a lo largo de la fibra nerviosa y a nivel de la terminal nerviosa.

#### FARMACOCINÉTICA:

Está descripta la absorción sistémica de los componentes de este producto.

#### POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

**Adultos y niños mayores de 6 años:** salvo mejor criterio profesional, diluir una a dos cucharaditas de café (2,5 ml a 5,0 ml) en medio vaso con agua tibia, y realizar buches o gargarismos cada 4 a 6 horas, de acuerdo con la localización de la afección. En caso de lesiones focalizadas o circunscriptas puede utilizarse puro, sin diluir, mediante topicaciones con hisopos embebidos en la solución. No requiere posteriores enjuagues bucales.

#### ADVERTENCIAS:

No utilizar más cantidad, con más frecuencia o durante un periodo más prolongado que el prescripto. La preparación deberá realizarse exclusivamente con agua, tal cual se indica en *"Posología y Modo de Administración"*.

Ante signos clínicos generales de infección bacteriana, debe evaluarse la necesidad de tratamiento antibiótico por vía oral general.

Evaluar la posibilidad de falsa vía por anestesia del carrefour orofaríngeo.

Riesgo de aparición de efectos sistémicos por absorción de anestésicos locales.

**Embarazo:** debido a que no se conocen estudios adecuados realizados en humanos, no se recomienda su uso durante el embarazo.

**Lactancia:** debido a que no se conocen estudios adecuados realizados en humanos y teniendo en cuenta el riesgo potencial para el lactante, no se recomienda su uso durante la lactancia.

**Uso pediátrico:** No se recomienda su uso en niños menores de 6 años (*Ver Contraindicaciones*).



VENTA BAJO RECETA

ME-1291-4  
150x150

## DORSO

#### PRECAUCIONES:

No ingerir. No utilizar durante más de cinco días.

El uso prolongado de esta medicación es susceptible de modificar el equilibrio microbiano natural de la boca y garganta, con el riesgo de sobreinfección bacteriana o fúngica (candidiasis).

Si la afección se acompaña de fiebre, cefalea o náuseas y vómitos, debe reevaluarse el cuadro clínico.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los principios activos o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Contraindicado en menores de 6 años.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Disminución de la sensibilidad a nivel de la lengua y mucosa oral.

Reacción alérgica a alguno de los componentes.

Los anestésicos locales del tipo éster, como la BENZOCAÍNA, presentan propiedades alergénicas. La BENZOCAÍNA se encuentra entre los medicamentos tópicos de sensibilización frecuente.

#### INTERACCIONES:

La BENZOCAÍNA es un anatógonista de las sulfamidas.

#### SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de sobredosis accidental, de inmediato se debe contactar al médico o recurrir al hospital más cercano.

• **Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / 4658-7777**

• **Hospital de Niños Ricardo Gutierrez: (011) 4962-9247**

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta y de la cantidad ingerida, el profesional decidirá la realización o no del tratamiento de rescate: vómito provocado o lavado gástrico, carbón activado, purgante salino (45 a 60 min. luego del C.A.), hemodiálisis.

#### CONSERVACIÓN:

**ALGIODENT Colutorio** debe ser conservado a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C, en su envase original y al abrigo de la luz y del calor.

#### PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 1, 50 (\*) y 100(\*) frascos de **ALGIODENT Colutorio** de 45 ml, con medida graduada ((\*) estos últimos para uso exclusivo hospitalario).

**Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.**

**MANTENER ESTE PRODUCTO Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Fecha última revisión: Diciembre de 2005.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.418.

**Director Técnico:** Fabián De Bonis, Farmacéutico.



**RONNET LABORATOIRES S.A.**

José E. Rodó 5940 - (C1440AJX)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 4687-7007

ME-1291-4  
150x150